

Alirokumab

Ny 5/17

Preparatnavn: Praluent

ATC-kode: C10AX14

Indikasjon:	Familiær hetrozygot hyperkolesterolemi
Diagnosekode:	ICD-10: E78.0 / ICPC-2:T93
Hjemmel:	§3a, jf. § 2 ICD-10: E78.0 ICPC-2: T93
Vilkår:	<ul style="list-style-type: none">- Gentest skal være utført- LDL-kolesterol \geq 5 mmol/L under pågående behandling med maksimalt tolererbare doser av statin og/eller ezetimib (Ezetrol)
Krav til tidligere behandling:	<p>For brukere som ikke tåler statiner (statinintoleranse): Minst 3 forhåndsgodkjente statiner (ATC-kode C10AA) og ezetimib (Ezetrol). Rosuvavastin eller atorvastatin i laveste dose skal være forsøkt</p> <p>For brukere som tåler statiner: Rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) eller atorvastatin (ATC-kode C10AA05) i høyeste tolererbare dose i kombinasjon med ezetimib (ATC-kode C10AX09).</p> <p>Ved kontraindikasjoner, jf. punkt 4.3 i SPC, mot statiner skal ezetimib (Ezetrol) være forsøkt.</p>
Spesialistkrav:	Søknad fra spesialist i indremedisin, spesialist i barnesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Indikasjon:	Hyperkolesterolemi ved etablert aterosklerotisk sykdom * (sekundærprevensjon)
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnosekode:	ICD-10: / ICPC-2:
Hjemmel:	§3a, jf. § 2 ICD-10: - 26 ICPC-2: - 26
Vilkår:	LDL-kolesterol \geq 4 mmol/L under pågående behandling med maksimalt tolererbare doser av statin og/eller ezetimib (Ezetrol)
Krav til tidligere behandling:	For brukere som ikke tåler statiner (statinintoleranse): Minst 3 forhåndsgodkjente statiner (ATC-kode C10AA) og ezetimib (Ezetrol). Rosuvavastin eller atorvastatin i laveste dose skal være forsøkt For brukere som tåler statiner: Rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) eller atorvastatin (ATC-kode C10AA05) i høyeste tolererbare dose i kombinasjon med ezetimib (ATC-kode C10AX09). Ved kontraindikasjoner, jf. punkt 4.3 i SPC, mot statiner skal ezetimib (Ezetrol) være forsøkt.
Spesialistkrav:	Søknad fra spesialist i indremedisin, spesialist i barnesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling *sekundærprofylakse etter akutt koronarsykdom (hjerteinfarkt, ustabil angina med sykehusinnleggelse), koronar- eller annen arteriell revaskularisering, angina pectoris, ischemisk hjerneslag eller symptomatisk perifer arteriell sykdom

Indikasjon:	Hyperkolesterolemi hos pasienter som får eller er aktuelle for LDL-aferebehandling
Diagnosekode:	ICD-10: E78.0 / ICPC-2:T93
Hjemmel:	§3a, jf. § 2 ICD-10: E78.0 ICPC-2: T93
Krav til tidligere behandling:	For brukere som ikke tåler statiner (statinintoleranse): Minst 3 forhåndsgodkjente statiner (ATC-kode C10AA) og ezetimib (Ezetrol). Rosuvavastin eller atorvastatin i laveste dose skal være forsøkt

For brukere som tåler statiner:

Rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) eller atorvastatin (ATC-kode C10AA05) i høyeste tolererbare dose i **kombinasjon med** ezetimib (ATC-kode C10AX09).

Ved kontraindikasjoner, jf. punkt 4.3 i SPC, mot statiner skal ezetimib (Ezetrol) være forsøkt.

Spesialistkrav:

Søknad fra spesialist i indremedisin, spesialist i barnesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Retningslinjer for rådgivende fagperson

Retningslinjene er bestemt av Helsedirektoratet i samarbeid med Statens legemiddelverk og fagmiljøet. Vilåårene er uttømmende for disse indikasjonene. Det ytes kun individuell stønad til de indikasjonene som omfattes av disse retningslinjene.

Dokumentet oppdateres ved behov, og er kun gyldig pr. dags dato.